

VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu



Trata-se de um inseto minúsculo, considerado atualmente uma das pragas mais prejudiciais aos castanheiros em todo o mundo, constituindo uma séria ameaça à sustentabilidade de soutos, pomares e castiçais. Originário da China, foi detetado na Europa (Itália) em 2002, tendo-se expandido a outros países, incluindo Portugal, em 2014.

Todas as variedades da espécie europeia *Castanea sativa* (o nosso castanheiro) são particularmente sensíveis a este inseto, que ataca as plantas causando a formação de galhas nos gomos e nas folhas, provocando assim a diminuição do crescimento dos ramos e impede a frutificação, podendo diminuir drasticamente a produção (com perdas superiores a 80%) e a qualidade da castanha e conduzir ao declínio dos castanheiros.

VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO

ALERTA NOVAS PLANTAÇÕES



Galhas nas folhas e/ou gomos

Corte da galha com larvas e insetos

SE PLANTOU CASTANHEIROS DURANTE O ÚLTIMO INVERNO:

- Até ao fim de maio faça inspeções semanais aos castanheiros que plantou.
- Não se esqueça de verificar os castanheiros plantados nas falhas (retancha).
- Se encontrou galhas nos castanheiros, retire-as para um saco e queime-as de seguida.

SE ENCONTRAR GALHAS DA VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO, DEVE INFORMAR O GABINETE TÉCNICO FLORESTAL DO MUNICÍPIO OU A SUA JUNTA DE FREGUESIA, DANDO INDICAÇÃO DO LOCAL, NÚMERO DE CASTANHEIROS ATACADOS E DATA DE PLANTAÇÃO. ESTES DADOS SERÃO DE IMEDIATO REPORTADOS À DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PISCAS E AO INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS.

A NÃO COMUNICAÇÃO DE NOVOS FOCOS PODE PÔR EM RISCO A PRODUÇÃO DE CASTANHA DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS!

ESTA PRAGA FOI JÁ DETETADA NO CONCELHO DE OLEIROS, PELO QUE A SUA AJUDA É MUITO IMPORTANTE PARA O SEU CONTROLO.



Contactos úteis:

Gabinete Técnico Florestal de Oleiros (272 680 130)

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (272 348 600)

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (272 348 140)